

第26回 日本検査血液学会学術集会

形態診断のためのケースカンファレンス

【症例3】

【症例3】 50歳台 女性

主訴 : 股関節痛

既往歴 : 乳癌

現病歴 : 3年前に乳癌に対して手術を施行後、他院にて経過観察されていた。汎血球減少のため、当院血液内科を受診し、1年5か月前に急性骨髄性白血病と診断された。二度の寛解導入療法を施行するも寛解に至らず、1年前に臍帯血移植が施行された。その後は寛解を維持していたが、LD高値および末梢血に芽球を認めたため骨髄穿刺が施行された。

【症例3】 検査所見

【血液一般】

WBC	6.2	×10 ⁹ /L
RBC	3.69	×10 ¹² /L
Hb	10.6	g/dL
Hct	35.5	%
Plt	105	×10 ⁹ /L
Ret	1.8	%
Myelo	1.0	%
Band	0.0	%
Seg	68.8	%
Lym	13.8	%
Mono	11.8	%
Eo	3.8	%
Baso	0.6	%
Blast	0.2	%

【凝固・線溶】







PT%	NA	%
PT-INR	NA	
APTT	NA	秒
Fbg	NA	mg/dL
D-D	NA	μg/mL
FDP	NA	μg/mL

【生化学】

TP	6.6	g/dL
ALB	NA	g/dL
LD	1118	U/L
AST	16	U/L
ALP	10	U/L
γ-GT	80	U/L
T-BIL	0.4	mg/dL
D-BIL	NA	mg/dL
UN	12.8	mg/dL
CRE	0.86	mg/dL
CRP	3.89	mg/dL

【症例3】末梢血所見

＜末梢血WG染色 症例3＞



【症例3】 骨髓所見

＜骨髓WG染色 症例3＞

